Name:
Adresse:

Langzeitinsulin	BASAL: Ins	Früh	Abends
Ess-Insulin	PRANDIAL	Früh	IE pro BE
	Insulin	Mittags	IE pro BE
		Abends	IE pro BE
Korrekturinsulin:	KORREKTUR	1IE senkt BZ	mg/dl
	Insulin	1BE hebt BZ	mg/dl

Funkt. Insulintherapie seit:
Gewicht:
Ziel BZ Korrektur: Nüchtern/Vor dem Essen: 100mg/dl (Bzw.:.....)
Nach dem Essen: 1h:<160mg/dl, (bzw.:.....); 2h:<140mg/dl
MBG-Zielbereich von: 130..... bis 160..... mg/dl)

12BE/Tag
1400kcal/d

Spritz-Ess-Abstand:

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																									0	0
	Norm I																									0	
	BZ																										MBG
	BE																									0	

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										

Tageszeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Datum	Verz. I																										
	Norm I																										
	BZ																										MBG
	BE																										